临床常用药物配伍禁忌速查表

按给药途径分类 · 输液配伍一查即知 · 测试版（共 5 页）

一、静脉输液配伍禁忌（第 1 页）

药物 A	药物 B	配伍结果	备注
青霉素类	维生素 C 注射液	不宜配伍	酸性环境加速青霉素分解
头孢曲松	含钙注射液	禁忌配伍	生成头孢曲松钙沉淀
呋塞米	酸性药物	不宜配伍	析出沉淀，堵塞针头
地塞米松	维生素 B6	不宜配伍	混合后变色、效价下降

本表仅供临床工作参考，具体配伍以药品说明书与药学部审核为准。

二、抗菌药物配伍（第 2 页）

药物 A	药物 B	配伍结果	备注
青霉素	头孢菌素	协同	同类作用机制，联用增效
氨基糖苷类	青霉素	协同	分开给药，间隔 1 小时以上
红霉素	青霉素	拮抗	快效抑菌剂减弱杀菌剂作用
喹诺酮类	含铝/镁抗酸药	吸收下降	间隔 2 小时以上服用

三、常用输液溶媒选择（第 3 页）

药物	宜选溶媒	不宜溶媒
青霉素类	0.9% 氯化钠注射液	5% 葡萄糖注射液（久置分解）
头孢哌酮舒巴坦	0.9% 氯化钠注射液	葡萄糖注射液
阿奇霉素	0.9% 氯化钠注射液	葡萄糖注射液（浓度需控制）
奥美拉唑	0.9% 氯化钠注射液	葡萄糖注射液

四、口服药物配伍注意（第 4 页）

药物 A	药物 B	注意
头孢类抗生素	酒精	双硫仑样反应，服药期间禁酒
华法林	维生素 K 含量高的食物	影响抗凝效果，需监测 INR
左甲状腺素	钙剂、铁剂	间隔 4 小时以上服用
降压药	柚子	柚子抑制代谢酶，血药浓度升高

五、速查口诀与说明（第 5 页）

1. 头孢遇钙要当心，沉淀堵塞害死人。

2. 青霉遇酸效价降，溶媒首选生理盐水。

3. 头孢配酒双硫仑，服药期间一滴不沾。

4. 配伍不明问药师，不要凭经验硬配。

测试说明：本文件为 r.bbq.pw 预览功能测试样张，共 5 页，由小咪生成；内容为常见配伍常识整理，仅供测试预览排版使用。